

Liste des plantes toxiques

Abricot (noyau)



Aconit



Nom latin :	Aconitum napellus
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute même sèche y compris les racines à petite dose
Principe actif toxique :	Plusieurs alcaloïdes dont l'aconitine, l'aconine et la benzylaconine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre ainsi que Cheval et rongeurs très sensibles
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, salivation, coliques, sécrétion excessive d'urine, perturbations du rythme cardiaque, refroidissement.
Biotope :	Jardin et Sauvage
Description	Plante élevée, robuste de 50 cm à 1 m, à grosse racine brun noir, renflée comme un navet. Fleurs en grappe élevée et dense d'un bleu-violet intense. Fleur régulière à symétrie bilatérale : 5 sépales pétaloïdes, le supérieur en casque, plus large que haut. 5 pétales réduits à des nectaires. Les deux supérieurs logés dans le casque. Nombreuses étamines. Fruit ayant 2 à 5 follicules. Feuilles vert foncé luisant dessus, vert pâle dessous, profondément découpées en lobes rayonnants comme les doigts de la main. Plante vivace. Floraison de juillet à septembre.
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion (neurotoxique)

Adonite de Printemps ou Adonis ou goutte de sang



Nom latin :	Adonis vernalis
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Un glucoside cardiotonique : l'adonitoxigénine
Animaux sensibles :	Chiens PM Chevaux Tortue terrestre - Chats très sensibles
Symptômes :	Vomissements, coliques Arythmie cardiaque
Biotope :	Sauvage sur collines ensoleillées et pentes herbeuses
Degré de toxicité :	Très toxique

Aglaonema



Nom latin :	Aglaonema commutatum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	Cristaux d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, respiration difficile, crampes, problèmes de coordination, pression sanguine basse, perturbations du rythme cardiaque.
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Agrumes

tous les agrumes en pot et en cuisine



Nom latin :	Concerne tous les agrumes : citronniers, orangers, kumquat, calamondin etc....
Famille :	Citrus
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Non décrits
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion, toxicité de contact, photosensibilisante

Ail



Nom latin :	Allium sativum
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Bulbe
Principe actif toxique :	Allicine, Ajoène
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Vomissements, salivation, problèmes de coordination, dilatation des pupilles, mouvements rythmiques des yeux, refroidissement.
Biotope :	Potager et à l'état sauvage
Degré de toxicité :	Toxique à très toxique par ingestion

Ailante ou vernis du Japon



Nom latin :	Allanhus Glandulosa
Famille :	
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	La toxine secrétée par cet arbre sert à l'élaboration d'un herbicide
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Irritant sur la peau et les muqueuses
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxicité de contact

Allamanda

(existe en plusieurs coloris)



Nom latin :	Allamanda
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	Latex
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Irritant sur la peau et les muqueuses+ diarrhées parfois mortelles
Degré de toxicité :	Toxique +Toxicité de contact

Alocasia



Nom latin :	Alocasia
Famille :	
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	Acide oxalique
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Irritant sur la peau et les muqueuses
Degré de toxicité :	Toxicité de contact

Aloès



Nom latin :	Aloe spp
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Suc Anthranoïdes, principalement de l'aloïne
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Diarrhée contenant du sang - Polyurie - sécrétion excessive d'urine (plus de 2,5 litres d'urine par jour); hématurie – globules rouges dans l'urine
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Amandier



Nom latin :	Prunus dulcis
Famille :	Rosacées
Partie toxique :	Noyau
Principe actif toxique :	Un hétéroside cyanogénétique, l'amygdaloside
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Dyspnée sévère avec tremblements musculaires et convulsions ; les muqueuses sont rouge brillant et la mort survient brutalement
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Amaryllis

(plusieurs coloris)



Nom latin :	Amaryllis belladonna
Famille :	Amaryllidacées
Partie toxique :	Toute la plante, en particulier les bulbes
Principe actif toxique :	Lycorine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des membres tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes Troubles du rythme cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en dessous de 60 par minute, hypotonie - basse pression sanguine
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Ancolie



Nom latin :	Aquilegia sp.
Famille :	Renonculaceae
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les graines
Principe actif toxique :	Glucoside cyanogénétique (transformable en cyanure)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin et sauvage des lisières de bois, prés ombragés, dans presque toute la France.
Description :	Tige rameuse de 50 cm. Feuilles découpées sur un long pétiole. Fleurs d'une belle couleur bleue sur un long pédoncule. Pétales prolongés vers l'arrière en un long éperon courbé. Nombreuses étamines plus longues que les pétales. Les plus internes avortent et se transforment en écailles qui entourent les ovaires après la floraison. Plante vivace. Floraison de mai à juillet.
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Anémone des bois



Nom latin :	toutes les espèces
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante principalement pendant la floraison
Principe actif toxique :	Ranunculine, substance très irritante et anémoneine
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux PM - Rongeurs et Tortues terrestres très sensibles
Symptômes :	Salivation, vomissements, diarrhée, urine contenant du sang, lors d'une forte dose mort par paralysie respiratoire ou collapse de la circulation.
Biotope :	Sauvage des forêts de feuillus, les buissons et les prairies
Degré de toxicité :	Toxique

Anthurium et Arum des fleuristes
(existe en divers coloris)



Anthurium



Fleur d'Anthurium



Feuille d'Anthurium



Fleur et feuilles d'Arum

Nom latin :	Anthurium andreanum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Jeunes feuilles et Sève
Principe actif toxique :	Oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, saignements (matrice, gencives), respiration difficile, difficulté à déglutir. et irritant de contact. Fort taux de mortalité
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion + toxicité de contact

Aralis
(diverses variétés)



Arbre à perruques



Nom latin :	Cotinus coggygeria
Famille :	Anacardiaceae
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, urine contenant du sang, respiration difficile, difficulté à déglutir.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Arnica des montagnes



Nom latin :	Arnica Montana
Famille :	Astéracées
Partie toxique :	Fleurs et racines
Principe actif toxique :	Hétéroside cardiotoxique et entérotoxique
Animaux sensibles :	Rongeurs et Tortue terrestre très sensibles
Symptômes :	Symptômes non décrits
Biotope :	Sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

Arum des fleuristes ou Calla



Nom latin :	Arum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Sève
Principe actif toxique :	Un alcaloïde, la conicine ; également saponosides et aiguilles d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, saignements(matrice, gencives), respiration difficile, difficulté à déglutir.+ irritant de contact. Fort taux de mortalité
Biotope :	Jardin Appartement
Degré de toxicité :	Très toxique + toxicité de contact

Arum tacheté ou Gouet maculé ou Cornet-gouet, Gouet, Pied de veau, Manteau de la vierge, Vachotte, Pilette-chandelle, Langue de boeuf, Herbe à pain, Racine amidonnière



fleur



fruits mûrs



feuilles

Nom latin :	Arum maculatum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Un alcaloïde, la conicine ; également saponosides et aiguilles d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Diarrhée, vomissements, saignements, respiration difficile, mouvements perturbés, pression sanguine basse, perturbations du rythme cardiaque
Biotope :	Appartement et plante sauvage des forêts de feuillus ombragées et humides, rives des ruisseaux
Description	Plante herbacée, glabre. Vivace par un tubercule qui porte un bouquet de feuilles hastées (en fer de lance), marquées de nombreuses taches noires. Au milieu d'elles, se dresse l'axe de l'inflorescence, appelé spadice, enveloppé de la spathe (feuille en cornet) vert pâle bordée de violet. Inflorescence: Le spadice mesure 7 à 8 cm de long et porte : -dans le bas, les fleurs femelles en groupe compact et réduites à un carpelle, - au-dessus, les fleurs mâles réduites à une étamine, souvent groupées par 4. Un groupe de fleurs stériles rudimentaires ou filamenteuses retient les insectes prisonniers jusqu'après la fécondation. L'appendice terminal se présente sous forme d'une massue charnue et violette ; il se flétrit après fécondation. Le groupe de fleurs devient un épi de baies rouge-orangé, charnues, au milieu de la spathe desséchée. La plante est vivace. La floraison a lieu d'avril à mai.

Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion
---------------------	----------------------------

Asclépiade (100 espèces différentes)



Nom latin :	Asclepias syriaca
Famille :	Asclépiadacées
Partie toxique :	Tout la plante mais surtout la sève
Principe actif toxique :	Substance à effet proche de la digitale et du strophantus
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, hypothermie
Biotope :	Jardin et Sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

Asparagus (souvent présent dans les bouquets)



Nom latin :	Asparagus
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Mâchonnement et Hyper salivation
Degré de toxicité :	Toxique

Aubépine



Nom latin :	Crataegus oxyacantha
Famille :	Rosacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les baies
Principe actif toxique :	Acide cyanhydrique, amygdaline, acide crataégoïque
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Salivation abondante, irritation de la gueule, diarrhées contenant du sang, tuméfaction, convulsions.

Biotope ::	Arbre sauvage
Degré de toxicité :	Moyennement toxique

Aucuba



Nom latin :	Aucuba japonica
Famille :	Cornacées
Partie toxique :	Baies et feuilles
Principe actif toxique :	Auculine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Diarrhées, coliques
Biotope ::	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Avocat



Nom latin :	Persea americana
Famille :	Lauracées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Persine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Rongeurs Oiseaux Perroquet Tortue terrestre très sensibles
Symptômes :	Oedemes gorge, poitrine abdomen et arrêt du coeur
Biotope ::	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Avoine jaune



Nom latin :	Avena
Famille :	Poacées
Partie toxique :	Toute la plante

Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux PM Oiseaux
Symptômes :	Courbure anormale de la colonne vertébrale, trottinement, inertie, fréquence cardiaque élevée et apathie.
Biotope :	Sauvage prairie des pré-alpes
Degré de toxicité :	Toxique par ingestion

Azalée et rhododendron
Existent en nombreux coloris:



Nom latin :	Rhododendron
Famille :	Ericacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	andromédotoxine, grayanotoxine oxalate de calcium, arbutine, éricoline
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre - Oiseaux très sensibles
Symptômes :	Salivation importante faiblesse, fièvre et bradycardie associées à une atteinte digestive ; pneumonie par fausse déglutition et mort sont fréquentes
Degré de toxicité :	Très toxique

Bégonia
(couleurs diverses et feuillage vert à panaché et parfois rouge)



Nom latin	toutes les espèces
Famille :	Bégoniacées
Partie toxique :	Toute la plante mais particulièrement les racines
Principe actif toxique :	Cristaux d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux Oiseaux
Symptômes :	Vomissements, diarrhée (après ingestion, diarrhée contenant du sang)+ irritant des muqueuses et de la peau
Degré de toxicité	Toxique + toxicité de contact

Belladone




feuilles et baies



fleur

Nom latin :	Atrop Belladona
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Alcaloïdes parasympatholytiques : scopolamine, atropine et hyoscyamine
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Sécheresse de la bouche, soif intense et nausées, tachycardie, dyspnée et atonie digestive. Excitation avec tremblements suivit d'un état de prostration évoluant vers le coma et la mort
Biotope :	Sauvage fréquente dans les clairières et les bois
Description :	1 mètre et plus, verte, fétide; feuilles supérieures géminées, inégales, pétiolées; fleurs d'un pourpre brunâtre, axillaires, penchées, pédonculées; corolle tubuleuse en cloche à lobes courts; baie globuleuse, noire et luisante, très vénéneuse
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Belle de nuit



Nom latin :	Mirabilis Jalapa
Famille :	Nyctaginacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Trigonelline (alcaloïde)
Animaux sensibles :	Rongeurs Tortue terrestre
Symptômes :	non décrits
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Berce du Caucase et toutes les Berces



Nom latin :	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
Famille :	Ombellifères
Partie toxique :	Toute la plante par contact ou ingestion
Principe actif toxique :	Toute la plante contient des furocoumarines (ou psoralènes) qui sont activées par la lumière solaire et rendent la peau très sensible à l'action du soleil.
Animaux sensibles :	Tous les animaux
Symptômes :	Plante photosensibilisante de contact : dermite localisée aux zones exposées au soleil (notamment les zones glabres et dépigmentées). L'expression clinique est très variable, allant de l'érythème léger jusqu'aux lésions bulleuses. Les atteintes buccale et oculaire sont toutefois moins fréquentes
Biotope :	Jardin et plante sauvage
Description :	Plante velue, élevée de 60 cm à 1,50 m à rhizome important qui émet sans cesse de nouvelles pousses, à odeur désagréable. Tiges creuses à poils rudes, anguleuses et profondément striées. Grandes feuilles amples et ondulées, découpées en lobes très variables. Toutes sont munies de larges pétioles engainants. Fleurs blanches en grandes ombelles de 10 à 15 cm de diamètre ayant de 10 à 40 rayons. Les pétales des fleurs extérieures sont inégaux et échancrés. Gros fruits circulaires très aplatis, ailés et marqués de bandes sombres. Plante vivace. Floraison de juin à octobre.
Degré de toxicité :	Très toxique par contact et ingestion

Bois joli ou bois gentil ou Daphné



Nom latin :	Daphne Mezereum
Famille :	Thyméléacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Peu connus même si l'on a identifié de nombreuses molécules : daphnine (dehydroxycoumarine) et daphnétoxine, mézéréine (résine).
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux PM Tortue terrestre
Symptômes :	Violente inflammation de la bouche tuméfaction des lèvres et de la langue vomissements.
Biotope :	Jardin et plante sauvage
Degré de toxicité :	Très toxique + toxicité de contact

Brione dioïque



plante



feuillage



fleur

Nom latin :	Bryonia dioica Jacq.
Famille :	Curcubitacées
Partie toxique :	Baies et rhizomes
Principe actif toxique :	Plusieurs glucosides dont la bryosine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Anorexie et vomissements, coliques sévères, diarrhée avec selles aqueuses, augmentation de la diurèse. L'évolution vers la paralysie, le coma puis la mort est possible
Biotope :	Sauvage des bois et des haies
Description :	Plante grimpante atteignant 3 m, munie de vrilles. Ses feuilles lobées sont rugueuses. Les fleurs sont disposées en panicule à l'aisselle des feuilles, corolle jaunâtre veinée de vert. Les fleurs mâles sont plus grandes, à long pédoncule. Les fleurs femelles sont à pédoncule court, les unes et les autres sur des pieds distincts. Baies rouges de 6 à 7 mm, (jaunes à maturité imparfaite). Plante vivace par son énorme racine blanche pivotante et charnue d'où le nom de navet du diable. Floraison de mai à août.
Degré de toxicité :	Toxique à très toxique

Brunfelsia



Nom latin :	Brunfelsia
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Scopoletine

Animaux sensibles :	Chiens Chats PM et surtout les rongeurs très sensibles
Symptômes :	
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique par ingestion

Buis et buis bénit



Nom latin :	Buxus sempervirens
Famille :	Buxacées
Partie toxique :	Tout même le bois
Principe actif toxique :	Nombreux alcaloïdes dont la buxine, la parabuxine, la buxinidine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre et surtout Chevaux très sensibles
Symptômes :	Vomissements diarrhée avec coliques, crampes, vertiges et convulsions Enfin tachycardie, dyspnée, parésie peuvent précéder l'apparition d'un coma évoluant brutalement vers la mort par paralysie respiratoire
Biotope :	Plante de jardin ou sauvage. Rare dans les forêts de feuillus, souvent utilisée comme arbuste ornemental dans les champs, les parcs ou les jardins
Description :	Arbrisseau pouvant vivre jusqu'à 600 ans, très rameux (1-5 m). Jeunes rameaux à section quadrangulaire. Feuilles opposées, entières, brièvement pétiolées, ovales, coriaces, luisantes, persistantes. Fleurs monoïques jaunâtres en petits glomérules à l'aisselle des feuilles. Fruit : capsule à 3 loges et 3 valves
Degré de toxicité :	Très toxique

Cacaoyer



Nom latin :	Theobroma cacao
Famille :	Sterculiacées

Partie toxique :	Feuilles ainsi que le chocolat en cuisine
Principe actif toxique :	Théobromine, théophylline et caféine
Animaux sensibles :	Chiens Chats Oiseaux PM
Symptômes :	<u>Carnivores</u> : après ingestion, vomissements puis symptômes nerveux (nervosité, halètement, agitation, ataxie, tremblements, hyperréactivité, convulsions) puis prostration évoluant vers le coma. La mort survient souvent en 6 heures à 3 jours par collapsus cardio-respiratoire. <u>Oiseaux</u> : prostration, régurgitations, diarrhées, convulsions et mort.
Biotope :	
Degré de toxicité :	Très toxique

Caladium



Nom latin :	Caladium
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	oxalate de calcium et toxiques méconnus
Animaux sensibles :	Chiens PM Et essentiellement les oiseaux et les chats
Symptômes :	Irritant pour la peau et les muqueuses. Brûlure, hyper salivation gêne respiratoire vomissements Complications rénales
Degré de toxicité :	Très Toxicité + toxicité de contact

Caoutchouc et ficus

Il existe une très grande variété de ficus tant dans les formes, les couleurs et le port



Caoutchouc



Ficus benjamina



Ficus pumila

Nom latin :	Ficus spp (elastica, lyrata, benjamina, diversicola, pumila, barbata)
Famille :	Ficacées

Partie toxique :	Toute la plante dont le latex substances vésicantes voisines de celles des euphorbiacées
Principe actif toxique :	furocoumarines photosensibilisantes
Animaux sensibles :	Chiens PM Lapins nains et Chats très sensibles
Symptômes :	Lors d'ingestion, vomissements, diarrhée, ptyalisme et lésions buccales, + chez le lapin : météorisme + chez le chat : prostration, mydriase, œdème de la face, atteinte rénale, + chez le chien : troubles de la démarche. Régession en quelques jours mais parfois mortel chez le chat
Degré de toxicité :	Très Toxicité par ingestion + toxicité de contact (photosensibilisante)

Caroubier



Nom latin :	Ceratonion siliqua
Famille :	Légumineuses
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Rongeurs uniquement
Symptômes :	Symptômes non décrits
Biotope :	Sauvage pourtour méditerranéen et jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Cerisier d'amour- Cerisier de Jérusalem ou Morelle faux piment



Nom latin :	Solanum pseudocapsicum
-------------	------------------------

Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante mais essentiellement les baies
Principe actif toxique :	Solanocapsine et alcaloïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, coliques
Degré de toxicité :	Toxique

Chanvre ou Cannabis



Nom latin :	Canabis sativa
Famille :	Cannabinacées
Partie toxique :	Fleurs et Feuilles
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Dilatation des pupilles, mouvements rythmiques des yeux, problèmes de coordination, vomissements, salivation, refroidissement.
Biotope :	Jardin (plante cultivée)
Degré de toxicité :	Toxique

Chélidoine ou herbe aux verrues



Nom latin :	Chelidonium majus
Famille :	Papaveraceae
Partie toxique :	Toute la plante y compris les racines et surtout les fruits

Principe actif toxique :	Chélidonine, isoquinoline. sanguinarine, protopine
Animaux sensibles :	Chats PM Tortue terrestre mais surtout Chiens très sensibles
Symptômes :	Salivation et soif intense, démarche hésitante, somnolence, puis convulsions et mort
Biotope :	Sauvage dans terrains vagues, friches, ruines et talus
Description	Plante légèrement velue à tiges fragiles, ramifiées. Sécrète un latex orangé. Feuilles molles, divisées, glauques en dessous. Fleurs jaunes dorées à 4 pétales en croix groupés en ombelles. Son fruit est une silique s'ouvrant par deux valves de la base au sommet. Plante vivace par sa souche noueuse mais se reproduisant abondamment par graines. Floraison de mai à octobre.
Degré de toxicité :	Très Toxique

Chèvrefeuille des buissons



Nom latin :	Lonicera xylosteum
Famille :	Caprifoliacées
Partie toxique :	Les baies
Principe actif toxique :	Glucoside cyanogénétique = xylostéine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Apathie, hyperthermie - température corporelle extrêmement élevée Système digestif: Coliques, diarrhée, vomissements Système cardio-vasculaire: Tachicardie - pulsations cardiaques au-dessus de 100 par minute, problèmes cardiaques et circulatoires
Biotope :	Plante sauvage. Lisières des forêts, haies
Degré de toxicité :	Peu toxique à toxique

Chou

et toute la famille (chou fleur, chou chinois, chou de Bruxelles ainsi que les choux d'ornement)



Nom latin :	Brassica oleracea
-------------	-------------------

Famille :	Brassicacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	S-méthyl-cystéine-sulfoxyde (anémie), glucosinolates : dont progoitrine, sinigrine, gluconapine, glucobracissine
Animaux sensibles :	Essentiellement les rongeurs surtout si ingérer de façon régulière ou en grande quantité
Symptômes :	
Degré de toxicité :	Toxique

Chrysanthème (plus de 200 variétés)



Nom latin :	Tous il en existe des centaines de variétés
Famille :	Astéracées
Partie toxique :	Feuilles et tiges
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Rongeurs (mortelle)
Symptômes :	Symptômes non décrits
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Ciguë

Toutes les ciguës (petites, grandes, ciguë du chien et ciguë vireuse y compris la fausse ciguë)



Détail feuillage petite ciguë



Fleurs



Détail feuillage grande ciguë

Nom latin :	Conium maculatum ou Aethusa cynapium ou Cicuta virosa
-------------	---

Famille :	Ombellifères
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Dérivé acétylénique la coniine l'aethusine l'aethusanol la cynapine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Rongeurs Chevaux Tortue terrestre Oiseaux surtout perroquets
Symptômes :	Excitation transitoire puis apathie, pouls ralenti devenant faible, respiration accélérée puis dyspnée. Ces signes s'accompagnent en général d'une analgésie et d'une paralysie ascendante des muscles striés : l'animal se couche et meurt alors de paralysie respiratoire
Biotope :	Sauvage de jardins, forêts, bas côtés (petite plante ressemblant au persil qui pousse à l'état sauvage- adventice-même dans les jardins)
Description	Plante de 20 à 90 cm(2m pour la grande), tige glabre finement striée. Feuilles découpées proches de celles du persil. Fleurs blanches en ombelles de 10 à 20 rayons. Se distingue du persil par ses feuilles plus brillantes. Une fois écrasée la ciguë dégage une odeur nauséabonde.
Degré de toxicité :	Très toxique

Clématite des haies et Clématite des jardins ou Vigne Blanche ou Herbe aux Gueux



Nom latin :	Clematis et clématis vitalba
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Feuilles surtout pendant la floraison et sève
Principe actif toxique :	Protoanémonidine = ranunculoside, hédéragénine (triterpène pentacyclique), et saponosides.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	le suc de la plante entraîne une inflammation de la peau et des muqueuses (action rubéfiante et vésicante). L'ingestion est quant à elle à l'origine d'une violente inflammation des muqueuses buccale et digestive, d'où ptyalisme, inrumination, puis coliques et constipation évoluant en une diarrhée noirâtre avec augmentation de la diurèse. Lors d'ingestion massive s'ajoutent fréquemment des troubles nerveux : convulsions, tremblements et mydriase, la mort pouvant survenir dans les 12 heures
Biotope :	Jardin et Sauvage
Degré de toxicité :	Toxique et toxicité de contact

Cœur de Marie ou Cœur saignant ou Cœur de Jeannette ou Cœur de Mariée



Nom latin :	Dicentera Spectabilis
Famille :	Fumariacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM particulièrement les rongeurs
Symptômes :	
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Clivie vermillon



Nom latin :	Clivia miniata
Famille :	Amaryllidacées
Partie toxique :	Tout mais particulièrement Oignon et tige
Principe actif toxique :	Alcaloïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, vomissements, diarrhée, lors d'une plus forte dose paralysie centrale
Degré de toxicité :	Toxique

Colchique

(faux safran ou safran bâtard)



Nom latin :	Colchicum autumnale
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante (même la fleur) fraîche ou sèche (foin), mais surtout corne et graines
Principe actif toxique :	Divers alcaloïdes dont la colchicine et un glucoside (le colchicoside)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux - Rongeurs et Tortue terrestre très sensibles
Symptômes :	Après 2 à 48h de latence, on observe du ptialisme, des coliques avec épreintes, ténesme et diarrhée blanchâtre, de l'inrumination. S'ajoutent parfois une hyperthermie modérée, une déshydratation rapide (d'où enophtalmie, tachycardie, agalaxie totale) et même un décubitus évoluant vers une paralysie sensitive et motrice (paralysie vésicale souvent présente) ; dans les cas graves, la mort survient en quelques heures à quelques jours par paralysie respiratoire Lésions : gastro-entérite avec ulcérations de la caillette et de l'intestin grêle, congestion et dégénérescence rénale
Biotope :	Plante cultivée des jardins ou Sauvage des montages
Degré de toxicité :	Très toxique

Coquelicot



Nom latin :	Papaver rhoeas
Famille :	Papaveracées
Partie toxique :	Toute la plante et surtout le suc laiteux
Principe actif toxique :	Nombreux alcaloïdes parmi lesquels rhoedine et morphine (traces)...
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre et surtout les Rongeurs Très sensibles
Symptômes :	Excitation à fureur pendant quelques heures-: Diarrhée contenant du sang - respiration difficile, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés- Crampes
Biotope :	Plante sauvage des Champs, bas-côtés, décharges
Degré de toxicité :	Toxique

Corydalis
(nombreuses espèces)



Coronille variée ou bigarrée



Nom latin :	Coronilla varia
Famille :	Légumineuses
Partie toxique :	Fleurs et Graines
Principe actif toxique :	Un alcaloïde de la fleur, la cytisine ; un hétéroside stéroïdique cardiotoxique de la graine, la coronilloside ; présence, enfin, d'acide L-nitropropionique dans le fourrage
Animaux sensibles :	Chevaux Rongeurs Tortue terrestre
Symptômes :	4 à 5 heures après l'ingestion, on voit apparaître mydriase, incoordination motrice, excitation, vertiges, sueurs, salivation et convulsions. Dans les cas sévères, le coma puis la mort par asphyxie surviennent dans les 4 heures qui suivent l'apparition des symptômes
Biotope :	Plante commune dans les prés et terrains vagues, Parfois ornementale dans les jardins. Se rencontre dans toute la France sauf nord, nord-ouest et Midi
Degré de toxicité :	Toxique

Cotonéaster



Nom latin :	Cotonéaster
Famille :	Rosacées
Partie toxique :	Surtout les baies
Principe actif toxique :	Amygdaline (hétéroside cyanogénétique)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Tuméfaction et brûlures dans la gueule, salivation excessive, vomissements, diarrhées

Degré de toxicité :	Peu toxique
---------------------	-------------

Couronne d'Épines ou Epine du Christ
(divers coloris et diverses variétés)



Couronne d'épines avec ses épines dangereuses



Autre variété

Nom latin :	Euphorbia milii
Famille :	Euphorbiacées
Partie toxique :	Suc laiteux
Principe actif toxique :	mal connu (éther de diterpène) et euphorbone
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Inflammation de l'estomac et des intestins, coliques, inflammation de la cornée et de la conjonctive, altérations des muqueuses de la gueule.
Degré de toxicité :	Toxique

Crocus
(divers coloris)



Croton
(panaché ou vert)



Nom latin :	Codiaeum
Famille :	Euphorbiacées
Partie toxique :	Sève incolore+ Ecorce et racine
Principe actif toxique :	diterpène, huile de croton
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	vomissements, diarrhées . également hyperthermie et de la tachycardie. Brûlures, en particulier au niveau des muqueuses de la gueule, dues au latex contenu dans la sève. Tremblements musculaires et une dilatation des pupilles
Degré de toxicité :	Très toxique

Cycade du japon



Nom latin :	Cycas revoluta
Famille :	
Partie toxique :	pépins, bourgeons, pollen
Principe actif toxique :	Glycoside et acide aminé BMAA
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	vomissements, diarrhées
Degré de toxicité :	Toxique

Cyclamen de Perse



Nom latin :	Cyclamen persicum
Famille :	Primulacées
Partie toxique :	Toute la plante et particulièrement les bulbes
Principe actif toxique :	Saponine triterpénoïde, cyclamine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, coliques, paralysie respiratoire, problèmes circulatoires; pâleur spécialement dans les plis de la peau, au coin de la bouche et sur les paupières; jaunisse. Crampes. Paralysie de la respiration
Degré de toxicité :	Toxique

Cytise
ou Faux ébénier ou Cytise aubour ou Pluie d'or



Nom latin :	Laburnum anagyroides ou Cytisus laburnum
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Toute la plante même les parties sèches
Principe actif toxique :	Cytisine, anagyrine (action voisine de la nicotine). phytohémagglutinines
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux
Symptômes :	Coliques, basse pression sanguine, transpiration, , crampes, problèmes de coordination le coma voire la mort par asphyxie peuvent survenir dans les 4 heures
Biotope :	Arbre des jardines et des parcs
Degré de toxicité :	Très toxique

Dame d'onze heure
ou ornithogale en ombelle



Nom latin :	Ornithogalum umbellatum
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	
Principe actif toxique :	Toute la plante surtout les tubercules
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Dépression - Perturbations du rythme cardiaque-: Salivation
Biotope :	Plante des jardins et Plante sauvage des prairies, champs, bas-côtés, vignes
Degré de toxicité :	Toxique

Datura
ou Brugmensia ou Stramoine ou Trompette des Anges ou Trompette du jugement



Nom latin :	Datura suaveolens
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Atropine, scopolamine, hyoscyamine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Excitation, dépression-: Vomissements, diarrhée, difficultés à déglutir- Oeil: Mydriase - dilatation des pupilles, problèmes de vue- Perturbations du rythme cardiaque - Muqueuse sèche, hyperémie de la peau - accumulation excessive de sang, liquide interstitiel ou lymphatique dans des endroits déterminés du corps
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Dauphinelle élevée
ou herbe à poux



Nom latin :	Delphinium elatum
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante surtout les graines
Principe actif toxique :	Divers alcaloïdes dont la delphinine et la staphysine (proches de l'aconitine)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Convulsions, excitation, mydriase, spasmes, incoordination puis paralysie généralisée. On observe également des diarrhées et vomissements, une hypersalivation, une dyspnée avec bradypnée et des troubles cardiaques (arythmie, fibrillation ventriculaire). Dans les cas les plus sévères, le sujet meurt asphyxié
Biotope :	Jardin et sauvage dans les prairies d'altitude des Alpes et des Pyrénées orientales,

	jusqu'à 2000m
Description	Plante vivace et herbacée, de grande taille (80 à 150 cm), à tiges dressées. Les feuilles sont de forme polygonale avec leur division principale disposée en éventail et à lobes très aigus. Fleurs bleu à violacé, sépales larges, ovales ou arrondis. Eperon plus long que les sépales. Les deux pétales inférieurs opposés à l'éperon, sont barbus.
Degré de toxicité :	Toxique à très toxique

Dieffenbachia
(diverses variétés)



Nom latin :	Dieffenbachia
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Sève, Feuilles, Surtout le Tronc et même l'eau d'arrosage
Principe actif toxique :	sels d'acide oxalique, cristaux d'oxalate de calcium, protéases.
Animaux sensibles :	Chiens PM Tortue terrestre Et surtout les chats et les Oiseaux
Symptômes :	<u>État général</u>: Incoordination, apathie, faiblesses, difficultés à déglutir, convulsions - crises provoquant des tressaillements et des hallucinations, et pouvant conduire à l'évanouissement <u>Système digestif</u>: Vomissements, diarrhée (éventuellement avec du sang), coliques <u>Voies respiratoires poumon</u>: Respiration difficile, perte de la voix <u>Système cardio-vasculaire</u>: Perturbations du rythme cardiaque <u>Oeil</u>: Altérations des yeux par contact avec le suc laiteux Irritant pour la peau et les muqueuses avec hyper salivation, sensation de brûlure Lésions rénales Fort taux de mortalité
Degré de toxicité :	Très toxique + toxicité de contact

Digitale



Nom latin :	Digitalis purpurea
Famille :	Scophulariacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Hétérosides stéroïdiques = digitoxigénine, purpureagluside A, gitoxigénine, purpureagluside B
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre

Symptômes :	Les troubles cardiaques provoqués par une concentration de digitaline trop élevée dans le sang sont redoutables et peuvent entraîner la mort.
Biotope :	Jardin et Sauvage des bois clairs et talus
Degré de toxicité :	Toxique à très toxique

Dracaena ou canne de Chine ou Dragonnier (nombreuses variétés)



Nom latin :	Dracaena Marginata
Famille :	Agavacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Oiseaux très sensibles
Symptômes :	Symptômes non décrits
Degré de toxicité :	Peu toxique à toxique

Epine-vinette ou Berberis



Nom latin :	Berberis vulgaris
Famille :	Berbéridacées
Partie toxique :	Tout sauf les baies mais surtout les racines
Principe actif toxique :	Berbérine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, problèmes rénaux
Biotope :	Jardin et Plante sauvage des lisières des forêts, clairières

Degré de toxicité :	Peu toxique
---------------------	-------------

Ergot de Seigle



Nom latin :	Claviceps purpurea
Famille :	Pyrénomycètes
Partie toxique :	Champignon
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, crampes épileptiques, Les membres deviennent bleu-noir
Biotope :	Surtout sur les épis de seigle et de tritcale, mais aussi dans les autres céréales et graminées
Description	On reconnaît facilement l'ergot aux corps (sclérotés) de couleur mauve foncé à noire qui remplacent les grains sur l'épi. Ces sclérotés mesurent de 2 à 20 mm de longueur selon l'espèce que l'ergot infecte. Sur le seigle à maturité, les sclérotés d'ergot deviennent souvent beaucoup plus longs que les grains eux-mêmes. Sur le blé et l'orge, les sclérotés se développent moins.
Degré de toxicité :	Très toxique

Eucalyptus diverses variétés



Nom latin :	Eucalyptus
Famille :	Myrtacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Glucoside cyanogénique, etheroxyde terpénique = eucalyptol ou cinéol, tanins
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, tachycardie, coma, mort.

Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Faux jasmin ou Jasmin étoilé



Nom latin :	Trachelospermum jasminoides
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Toute la plante mais particulièrement la sève
Principe actif toxique :	Alcaloïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Hyper salivation, gastro-entérite, et, dans de rares cas particulièrement graves, des signes neuromusculaires (sommolence, incoordination, parfois convulsions). L'évolution est généralement favorable en quelques jours.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Fèves des marais



Nom latin :	Vicia Faba
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Fèves crues ou cuites : substance toxique dans les graines et le pollen
Principe actif toxique :	

Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles
Symptômes :	Manque d'appétit, fièvre - : Vomissements, diarrhée, coliques - : Oligurie : la quantité d'urine sécrétée est en dessous de la normale en comparaison du liquide ingéré - Anémie – réduction de la capacité d'oxygénation du sang: pâleur, spécialement dans les plis de la peau, les coins de la bouche et les paupières - Tuméfaction de la rate et du foie
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Flax



Nom latin :	Pandanus
Famille :	Pandanacées
Partie toxique :	
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	
Symptômes :	Non décrits
Degré de toxicité :	Toxicité possible

Fougère



Nom latin :	Toutes les espèces
Famille :	Polypodiacées
Partie toxique :	Toute la plante de toutes les espèces

Principe actif toxique :	Filicine, floroglucide thiaminase, tanins et hétéroside cyanogénétique
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre - Chevaux très sensibles Rongeurs très sensibles
Symptômes :	Diarrhée contenant du sang, urine contenant du sang, tressaillements musculaires, problèmes moteurs, crampes, réactions allergiques
Biotope :	Jardin et sauvages des forêts de feuillus et les lieux déboisés
Degré de toxicité :	Très toxique

Frêne



Nom latin :	Fraxinus excelsior
Famille :	Oléacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chevaux
Symptômes :	Incoordination, apathie, baisse de la lactation - : Constipation - incapacité de déféquer; coliques - fortes douleurs convulsives, dont l'intensité augmente, atteint un point culminant puis diminue brièvement avant de recommencer- Œdème sous-cutané - accumulation anormale de liquide sous la peau qui provoque un gonflement (visible)
Biotope :	Jardin et à l'état sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

Fusain



Nom latin :	Evonymus europaeus
Famille :	Célastracées
Partie toxique :	Principalement les graines mais toutes les parties sont toxiques, même l'écorce
Principe actif toxique :	Plusieurs alcaloïdes, notamment l'évonymine ainsi qu'un hétéroside cardiotonique

	en faible quantité, la digitoxigénine
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Principalement digestifs avec diarrhées éventuellement hémorragiques, coliques et constipation chez les équidés. On observe également des convulsions avec tachycardie évoluant en abattement et prostration voire syncopes Lésions : gastro-entérite pouvant être hémorragique
Biotope :	Jardin et sauvage de bois et haies d'Europe, sur sol calcaire, en plaine et jusqu'à 1600m d'altitude dans le sud de la France
Degré de toxicité :	Toxique

Garou



Nom latin :	Daphne gnidium
Famille :	Thyméléacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les baies et l'écorce même sèche
Principe actif toxique :	Peu connus même si l'on a identifié de nombreuses molécules : daphnine (dehydroxycoumarine) et daphnétoxine, mézéréine (résine)...
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux
Symptômes :	Après une courte latence, on observe une violente inflammation de la bouche, avec tuméfaction des lèvres et de la langue, ptyalisme, vomissements. Secondairement s'installe une diarrhée souvent hémorragique avec coliques. Enfin, dans les cas graves, on note une ataxie avec convulsions, dyspnée, albuminurie et hématurie Lésions : gastro-entérite souvent hémorragique, oedème du poumon, néphrite
Biotope :	Jardin et à l'état sauvage dans les bois
Degré de toxicité :	Toxique

Genêt à balai



Nom latin :	Sarthothamnus scoparius
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	La spartéine (qui intervient dans les troubles du rythme cardiaque) et la cytosine

	(symptômes nerveux), une amine aromatique (vasoconstrictrice) et des flavonoïdes diurétiques
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, constipation - Paralysies - Tachycardie - accélération du cœur: fréquence cardiaque au-dessus de 100 pulsations par minute - Inconscience, excitation
Biotope :	Jardin et plante sauvage des forêts sablonneuses et claires et des talus
Degré de toxicité :	Peu toxique

Genévrier sabine et Genévrier thurifère Juniperus sabine et thurigère



il existe 70 espèces de genévriers et nous ne pouvons toutes les indiquer ici. Toutes contiennent à des doses différentes des agents toxiques dont au moins la thuyone et l'alcool terpénique. Par mesure de précaution, ne pas laisser un animal en manger

Nom latin :	Juniperus sabina et Juniperus thurifera
Famille :	Cupressacées
Partie toxique :	toutes
Principe actif toxique :	thuyone, alcool terpénique (sabinol) et l'acide gallique qui se transforme en pyrogallol
Animaux sensibles :	tous
Symptômes :	Les rameaux de genévrier sabine provoque de violentes irritations de toutes les muqueuses. Lors d'empoisonnements, on observe une atteinte du système nerveux avec convulsions dont la responsabilité est attribué au sabinol. Le pyrogallol bloque complètement le circuit intestinal, les animaux qui en ont consommé meurent rapidement.
Biotope :	Plante sauvage du sud de l'Europe Alpes et Pyrénées
Degré de toxicité :	Très toxique

Genevrier commun Juniperus commun



Nom latin :	Juniperus communis
Famille :	Cupressacées
Partie toxique :	toutes

Principe actif toxique :	thuyone, alcool terpénique
Animaux sensibles :	tous
Symptômes :	L'ingestion peut entraîner des symptômes mineurs comme un urticaire, des vomissements, des diarrhées. L'ingestion de petites quantités ne devrait pas porter à conséquence. Dermatite de contact avec cloques et brûlures pouvant être importantes en raison des tanins
Biotope :	Plante courante dans les jardins
Degré de toxicité :	toxique par ingestion et toxicité de contact

Géranium

(nombreuses variétés nombreux coloris)



Nom latin :	Pélargonium
Famille :	Geraniacees
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Irritation des muqueuses et de la peau
Degré de toxicité :	Toxique et toxicité de contact

Ginkgo biloba ou Arbre aux 100 écus



Ginkgo Biloba

Nom latin :	Ginkgo biloba
Famille :	Ginkgoacées
Partie toxique :	Non décrite
Principe actif toxique :	Acide ginkgolique et alkylphénol
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Rongeurs
Symptômes :	Foie cœur atteints + dermatites de contact
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion et par contact

Glaïeul



Glycine



Nom latin :	Wisteria sinensis
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Toute la plante et particulièrement les gousses
Principe actif toxique :	Composés toxiques méconnus (wistérine), phytoagglutinine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Diarrhée, Problèmes circulatoires Dilatation des pupilles Vomissements
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Grande consoude



Nom latin :	Symphytum officinale
Famille :	Borraginacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Domages au foie possibles uniquement en cas d'ingestion de grandes quantités
Biotope :	Plante sauvage. Fossés herbeux et humides, rives
Degré de toxicité :	Très peu toxique

Gui



Nom latin :	Viscum album
Famille :	Loranthacées
Partie toxique :	Toute la plante mais essentiellement les baies (souvent présents à Noël dans les appartements)
Principe actif toxique :	Un polypeptide, la viscotoxine mais aussi acétylcholine et saponosides
Animaux sensibles :	Chiens PM et surtout Chats Rongeurs Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Dérangements du système digestif, tressaillements musculaires, sécrétion excessive d'urine, dilatation des pupilles, allergies
Degré de toxicité :	Toxique surtout pour le chat

Gypsophile (ou brouillard dans les bouquets)



brouillard des bouquets

Nom latin :	Gypsophila paniculata
Famille :	
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Saponine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Irritation de la peau, irritation des voies respiratoires, asthme, étouffement.
Degré de toxicité :	Toxique

Haemanthus (divers coloris)



Nom latin :	Haemanthae
Famille :	Amaryllidaceae
Partie toxique :	Toute la plante de toutes les espèces
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des membres tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes Troubles du rythme cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en dessous de 60 par minute, hypotonie - basse pression sanguine
Degré de toxicité :	Très toxique

Haricot



Nom latin :	Phaseolus vulgaris
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Haricot cru
Principe actif toxique :	Une hémagglutine et un hétéroside cyanogénétique, la phaséolunatine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Déplaisir à refus de s'alimenter, diarrhée, inflammation de l'estomac et des intestins, crampes.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Héliotrope



Massif d'héliotrope

Détail fleur

Héliotrope sauvage

Nom latin :	Heliotropium
Famille :	Boraginacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Pyrrolizidine
Animaux sensibles :	Chiens Chats ChevauxTortue terrestre - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	<u>Forme aiguë rare</u> : hypothermie, ictère avec oedèmes et éventuellement hémoglobinurie. Excitation ou agressivité. La mort survient en 4 à 6 jours <u>Forme subaiguë à chronique fréquente</u> : diminution progressive de l'état général, amaigrissement avec ictère, signes de gastro-entérite et éventuellement troubles nerveux chez le cheval (parésie, délire démentiel) Lésions : nécrose et hémorragies hépatiques (formes aiguës), dégénérescence hépatique avec nécrose centrolobulaire, prolifération des canaux biliaires, fibrose hépatique, cirrhose hypertrophique (formes chroniques)
Biotope :	Jardin et à l'état sauvage
Description :	A l'état sauvage, ses feuilles sont vert pâle sur les deux faces. Ses fleurs sont blanches ou rosées, groupées en hampes scorpioïdes. Floraison de juin à août
Degré de toxicité :	Très toxique

Hellébore fétide ou Pied de griffon



Nom latin :	Helleborus foetidus
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Un hétéroside stéroïdique à action cardiaque, hellébroside et divers saponosides à action purgative, sur le système nerveux et ocytocyque (helléborine, helléboréïne) résistant à la dessiccation ; protoanémonine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, fréquence cardiaque élevée, paralysies, dilatation des pupilles.
Biotope :	Jardin et Sauvage sur les versants pierreux et les forêts
Description	Plante de 50 cm à 1 m, à odeur fétide, qui reste verte l'hiver. Fleurs vertes de 2 cm en forme de clochettes penchées, bordées de rouge. Pétales réduits à de petites feuilles nectarifères. Les feuilles ont un large pétiole foliacé à nervures parallèles, terminé par 5 à 6 lobes. Vert clair, elles se confondent avec les fleurs. Fruit en follicule. Plante vivace par un rhizome. Floraison de janvier à mars.
Degré de toxicité :	Très toxique

Hellébore noir ou Rose de Noël ou Rose d'hiver



Nom latin :	Helleborus niger
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Saponosides et hétérosides stéroïdiques cardiotoxiques = hellébrine et hellébroside, protoanémonine.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, paralysies, excitation, dilatation des pupilles.
Biotope :	Jardin et sauvage dans les forêts et buissons subalpins
Degré de toxicité :	Très toxique

Hellébore vert



Nom latin :	Helleborus
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, battements cardiaques lents, perturbations du rythme cardiaque, arrêt cardiaque, paralysie, excitation
Biotope :	Jardin et Sauvage
Description :	Plante herbacée vivace rhizomateuse (20-40 cm). Tige nue de la base aux pédoncules floraux, disparaissant en hiver. Feuilles basales raides, vert foncé, palmées profondément découpées. Fleurs par 2-4 penchées en coupe de 4-5 cm, inodores. Floraison mars avril
Degré de toxicité :	Très toxique

Houx

(souvent présent au moment de Noël)



Hydrangea ou Hortensia



Nom latin :	Hydrangea
Famille :	Hydrangeaceae
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Acide hydrocyanique = hydrangéine, semblable au cyanure
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Contient une toxine semblable au cyanure, un poison à action très rapide qui cause l'asphyxie et d'autres symptômes y compris la mort

Degré de toxicité :	Très toxique
---------------------	--------------

If



Nom latin :	Taxus Baccata
Famille :	Taxacées
Partie toxique :	Toute la plante même sèche
Principe actif toxique :	Taxine, diterpènes dérivés du taxane : le taxol.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, accélération/ralentissement du coeur, respiration difficile, mouvements perturbés, sécrétion de l'urine perturbée, dilatation des pupilles.
Biotope :	Jardin
Description :	C'est un arbre décoratif. L'écorce est en effet brun rougeâtre profondément sillonnée, son bois est rouge et les feuilles en forme d'aiguille de sapin sont vert foncé au dessus et vert clair au dessous. L'aspect général de l'arbre peut être confondu avec celui d'un conifère. La floraison a lieu d'avril à mai et la fructification s'étend de juillet à octobre. Le fruit est rouge vermillon et renferme une grosse graine brune et luisante.
Degré de toxicité :	Très toxique

Ivraie enivrante ou herbe à couteaux



Nom latin :	Lolium temulentum
Famille :	Graminées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Contaminée par un champignon (Endoconidium temulentum) un alcaloïde, la témuline
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles
Symptômes :	Ivresse, vertiges, démarche chancelante, tremblements, mydriase, perte de l'équilibre et convulsions dans les cas graves ; la mort reste rare
Biotope :	Présente dans les champs de céréales et les prairies
Degré de toxicité :	Toxique

Ipomée ou Volubilis ou Gloire du matin



Nom latin :	Ipomoea volubilis
Famille :	Convolvulacées
Partie toxique :	Graines
Principe actif toxique :	Acaloïdes, LSD
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Mydriase, vomissements, diarrhées, crampes, refroidissement
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Iris

(nombreux coloris)



Nom latin :	Tous
Famille :	Iridacées
Partie toxique :	Toute la plante, en particulier les bulbes
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des membres tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes Troubles du rythme cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en dessous de 60 par minute, hypotonie - basse pression sanguine
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Jacinthe



Nom latin :	Hyacinthus orientalis
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Vomissements, coliques, diarrhées
Biotope	Jardin et appartement
Degré de toxicité :	Peu toxique

Jonquille ou Narcisse



Nom latin :	Narcissus spp.
Famille :	Amaryllidacées
Partie toxique :	Feuilles et bulbes
Principe actif toxique :	Plusieurs alcaloïdes dont la Lycorine et la Narcissine et des saponosides
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, vomissements, diarrhée. Rarement, des symptômes nerveux (sédation, convulsions) et cardiovasculaires (hypotension, ralentissement cardiaque) peuvent apparaître.
Biotope	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Jusquiame blanche et Jusquiame noire



Nom latin :	Hyoscyamus albus Hyoscyamus niger
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les racines et les graines
Principe actif toxique :	Alcaloïdes = hyosyamine, scopolamine, atropine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Les rongeurs sont très sensibles
Symptômes :	Frénésie, soif - : Constipation - Augmentation anormale de la fréquence respiratoire - : Paralysies - Prostrations évoluant vers le coma et la mort
Biotope :	Sauvage du pourtour méditerranéen (blanche) Terrains labourés ou nus, surtout près de la mer, mais également en montagne jusqu'à 1500m ; elle est absente dans le sud-est de la France
Description :	La jusquiame possède une tige dressée et cylindrique pouvant atteindre 1 mètre de haut. Ses feuilles, profondément dentées, longues, poilues, de couleur vert foncé, sont soyeuses. Les fleurs tubuleuses, toutes rejetées d'un côté, ressemblent à des lys à cinq pétales, elles sont jaune pâle, veinées de violet noirâtre; elles fleurissent de mai à juin.
Degré de toxicité :	Très toxique

Kalanchoé

(divers coloris et très nombreuses variétés)



Nom latin :	Kalanchoe spp.
Famille :	Crassulacées
Partie toxique :	Les feuilles
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chien Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Incoordination, convulsions - crises, qui provoquent des démangeaisons, des tressaillements, des hallucinations et un sentiment de peur. Elles

	peuvent aller jusqu'à l'évanouissement; dépression+ Voies respiratoires et poumon: Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés
Degré de toxicité :	Toxique

**Laurier de Nouvelle-Zélande, Laurier cerise, Laurier amande,
Laurier aux crèmes, Laurier lait
Laurier des bois**



Feuillage et fruits du Laurier de Nouvelle Zélande



Fruits du Laurier-Cerise

Nom latin :	Corynocarpus laevigatus ou Prunus laurocerasus
Famille :	Rosacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout graines et feuilles
Principe actif toxique :	Pour le laurier cerise : acide cyanhydrique, acide prussique. Pour le laurier des bois : mézéréine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Vertiges, immobilisation, sang et muqueuses rouge clair. Dans des cas extrêmes la mort survient en quelques secondes pratiquement sans symptômes préalables - Salivation dyspnée - respiration difficile, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés -: Crampes, paralysies
Biotope :	Jardin et Parcs
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Laurier Kalmie



Nom latin :	Kalmia angustifolia
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	Andromédotoxine, arbutine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Salivation excessive, écoulement nasal et oculaire, vomissements, diarrhées, troubles locomoteurs, convulsion, paralysie, coma, mort
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très Toxique

Laurier Rose ou Oléandre



Nom latin :	Nérîum Oleander
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Fleurs Feuilles et bois même secs
Principe actif toxique :	Plusieurs hétérosides cardiotoniques à action digitalique : oléandroside, nérioside
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Oiseaux Tortue terrestre
Symptômes :	Toute la plante contient à la fois des substances irritantes et des produits cardiotoxiques. Les premiers symptômes sont liés à l'effet irritant (diarrhée, vomissements). Puis, lorsque l'intoxication évolue, les troubles cardiaques apparaissent. Enfin, des troubles nerveux peuvent se produire
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion

Lierre terrestre ou Herbe de Saint-Jean



Nom latin :	Glechoma hederacea
Famille :	Lamiacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chats PM Tortue terrestre - Chevaux et Chiens très sensibles
Symptômes :	Transpiration, tremblements, manque d'appétit, écoulements muqueux hors de la gueule, de mousse rougeâtre jaunâtre hors du nez - respiration difficile, tachypnée - augmentation anormale de la fréquence respiratoire, râle, toux - Tachycardie (fréquence cardiaque au-dessus de 100 pulsations par minute) avec un pouls faible
Biotope :	Plante sauvage. Prairies, forêts, buissons, clôtures, murs
Description :	Plante molle à tige quadrangulaire rampant sur le sol. Les rameaux fleuris sont dressés, de 5 à 25 cm. Feuilles en coeur résistantes aux froids de l'hiver, à odeur agréable. Petites fleurs violet-rose groupées à l'aisselle des feuilles par 3 ou 4. Plante vivace par ses tiges rampantes qui après la floraison continuent à envahir le terrain. Floraison de mars à avril.
Degré de toxicité :	Très toxique

Lierre commun
très nombreux coloris



Nom latin :	Hedera Helix
Famille :	Araliacées
Partie toxique :	Les feuilles, les baies, la chair des fruits, la tige et le jus de la plante sont toxiques
Principe actif toxique :	Saponosides (hédéragénine, acide oléanolique).
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Caprins
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, salivation, crampes, paralysies, excitation.
Degré de toxicité :	Toxique

Lin cultivé



Nom latin :	Linum usitatissimum
Famille :	Linacées
Partie toxique :	Graines et germes
Principe actif toxique :	Un hétéroside cyanogénétique, le linamaroside et la lotaustraline
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Vertiges, tremblements - Vomissements - Crampes, convulsions - Tachypnée (augmentation anormale de la fréquence respiratoire), arrêt respiratoire (lors de cas extrêmes, la mort peut survenir en quelques secondes) - Bradycardie: pulsations cardiaques en dessous de 60 par minute
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Lobélie
(plusieurs coloris)



Nom latin :	Lobelia
Famille :	Campanulacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Lobelamine, lobeline
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Dilatation des pupilles, salivation excessive, vomissements, diarrhée, convulsions, coma, mort.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Lupin



Nom latin :	Lupinus
Famille :	Légumineuses
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Lupinine, anagyrene, sparteine, et hydroxylupanine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Vomissements, incoordination, crampes, tremblements, respiration difficile, agitation, dépression, coma, pâleur.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Luzerne cultivée



Nom latin :	Medicago sativa
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Feuilles et tige
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Photosensibilisante provoquant des dermatoses - inflammation de la peau (se manifeste par des tâches ou de petites cloques), qui apparaît lors d'une exposition au soleil Autre: Troubles de la fertilité et de la croissance
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique et toxicité de contact

Lys



Nom latin :	Lilium
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Colchicine
Animaux sensibles :	Chiens PM et surtout Chats très sensibles ainsi que lapins, rats et oiseaux
Symptômes :	Chez les plus sensibles (chats lapins rats) Après quelques heures, hyper salivation, vomissements, perte d'appétit. En 2 à 3 jours, déshydratation, troubles nerveux (ataxie, dépression, convulsions), œdèmes de la face et des membres, dyspnée. Insuffisance rénale avec anurie, urémie, créatininémie, polyurie, protéinurie, glycosurie et cylindres tubulaires épithéliaux. Souvent mortel en 3-6 jours. Autres animaux : troubles gastro-intestinaux, sans atteinte rénale ni nerveuse
Degré de toxicité :	Très toxique pour les chats, les rats et les lapins

Marron d' Inde



Nom latin :	Aesculus hippocastanum
Famille :	Hippocastanacées
Partie toxique :	Fruit, tégument de la graine et écorce
Principe actif toxique :	le fruit, le tégument de la graine et l'écorce sont riches en tanins, les cotylédons en saponosides triterpéniques, l'écorce renferme en outre, des hétérosides coumariniques ; on trouve également des flavonoïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	Hyperthermie, un affaiblissement et des troubles nerveux du type ataxie, paralysie faciale, incoordination motrice. nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, troubles neurologiques graves, paralysies.
Biotope :	Jardin et sauvage Poussant naturellement dans les forêts humides à basse altitude
Degré de toxicité :	Toxique

Mercuriale



Nom latin :	Mercurialis annua
Famille :	Euphorbiacées
Partie toxique :	La plante même sèche est toxique, avec un pic à la maturation des fruits, en fin d'été
Principe actif toxique :	(tri)-méthylamine, saponosides et hermidine (chromogène)
Animaux sensibles :	Chiens Chats Chevaux très sensibles - PM et Lapins très sensibles
Symptômes :	Oligurie avec une urine colorée (rose clair à brun rouge, brun foncé) car hémoglobinurie et/ou hématurie, dysurie évoluant vers anurie. Troubles digestifs (gastro-entérite, météorisation, salivation, diarrhées, coliques) et une anémie intense
Biotope :	Jardin et sauvage - On trouve cette plante adventice commune et nitrophile dans les décombres, les jardins et les champs
Degré de toxicité :	Toxique

Millepertuis



Nom latin :	Hypericum perforatum
Famille :	Hypericacées
Partie toxique :	Tout surtout feuilles et fleurs
Principe actif toxique :	Hypéricine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PL Oiseaux - Tortue terrestre et Chevaux très sensibles
Symptômes :	Anorexie - manque d'appétit, nervosité, parfois convulsions - crampes fébriles : Lésions apparaissant sur la peau, pelage ou plumage dans les 1-2 jours (rougeurs, œdèmes, croûtes noires) à des endroits de la peau non pigmentés, peu velus (paupières, gueule, mamelles), et qui sont exposés au soleil
Biotope :	Plante sauvage. Buissons, bas-côtés, prairies, talus, forêts claires
Degré de toxicité :	Toxique et toxicité de contact (photosensibilisante)

Morelle Douce-Amère ou Morelle grimpante



Fleur de la Morelle Douce Amère



Fruits mûrs de la Morelle Douce Amère

Nom latin :	Solanum dulcamara
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante avec une toxicité moindre des baies
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Prostration et vertiges, crises convulsives puis une incoordination motrice évoluant en paralysie des membres postérieurs (position de chien assis). Parallèlement, on observe mydriase, anorexie, diarrhées avec coliques salivation, vomissements, arrêt cardiaque - Stomatite - inflammation des muqueuses buccales.
Biotope :	Plante sauvage des Forêts humides, rives, buissons
Description :	Sous-arbrisseau à tige ligneuse de 50 cm à 2 m, plus ou moins grimpante, les rameaux de l'année sont herbacés. Feuilles ovales, alternes, souvent avec deux lobes à la base. Inflorescence en grappe lâche. Fleurs violettes à 5 pétales étalés en étoile, un peu renversés, à 5 étamines rapprochées en cône, jaunes. La gorge de la corolle est garnie de 5 écailles vertes. Une pépité d'or dans un écrin violet. Les fruits sont des baies ovoïdes, jaunes puis rouges, vénéneuses, à saveur d'abord aqueuse-sucrée et

	ensuite brûlante. Elles contiennent de nombreuses petites graines. Plante vivace. Floraison de juin à septembre.
Degré de toxicité :	Très toxique

Morelle noire




Fleur de la Morelle Noire



Fruits mûrs

Nom latin :	Solanum nigrum
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les baies
Principe actif toxique :	Un gluco-alcaloïde stéroïdique, la solanine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Paralysie, excitation, pâleur, jaunisse, dommages rénaux, irritation des muqueuses
Biotope :	Jardin (adventice) et sauvage
Description :	Sous-arbrisseau à tige ligneuse de 50 cm à 2 m, plus ou moins grimpante. Les rameaux de l'année sont herbacés. Feuilles ovales, en losange un peu dentées. Inflorescence en grappe lâche. Fleurs blanches à 5 pétales étalés en étoile, à 5 étamines rapprochées en cône. Les fruits sont des baies ovoïdes, vertes puis noires, vénéneuses, à saveur d'abord aqueuse-sucrée et ensuite brûlante. Elles contiennent de nombreuses petites graines. Plante bisannuelle ou vivace. Floraison de juin à septembre.
Degré de toxicité :	Très toxique

Mouron rouge bleu ou blanc des oiseaux



Nom latin :	Stellaria media
Famille :	Caryophyllacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Divers saponosides triterpéniques (substances tensio-actives, donc moussantes)
Animaux sensibles :	Rongeurs Chevaux
Symptômes :	Gastro-entérite avec ulcération du tube digestif, diarrhées, hyper salivation. Anémie d'origine hémolytique. Dans les cas graves, des tremblements et une incoordination motrice peuvent évoluer vers la mort. Lésions : sang laqué, incoagulable, lésions de dégénérescence hépatique
Biotope :	Adventice commune des sols cultivés y compris jardin, des terrains vagues, des lieux humides et des vieux murs, jusqu'à 2000m d'altitude

Degré de toxicité :	Toxique
---------------------	---------

Moutarde noire



Nom latin :	Brassica nigra
Famille :	Crucifères
Partie toxique :	Les graines
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Rongeurs Chevaux Oiseaux très sensibles
Symptômes :	Chez le cheval : dépression respiratoire et jetage spumeux important (jusqu'à 10 litres en 1 h), puis mort par asphyxie Chez l'oiseau : entérite, troubles pulmonaires et rénaux Lésions : œdème aigu du poumon (chez le cheval seulement), congestion, inflammation, œdème du tube digestif, néphrite
Biotope :	Plante adventice commun dans les terrains vagues, sur les talus, bords de ruisseaux et littoraux et les jardins
Degré de toxicité :	Toxique


Muguet



Nom latin :	Convallaria majalis
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les fleurs et les fruits
Principe actif toxique :	Deux hétérosides cardiotoniques (convallaside et convallatoxine) et un saponoside à action irritante et diurétique, la convallarine
Animaux sensibles :	Chiens PM Tortue terrestre - Chats et oiseaux très sensibles
Symptômes :	Vomissements, diarrhée, perturbations du rythme cardiaque, basse fréquence cardiaque, crampes, respiration difficile, insomnie.

Degré de toxicité :	Très toxique pour les chats (une des principales causes d'intoxication)
---------------------	--

Nielle des champs - Nielle des blés - Œillet des champs



Nom latin :	Agrostemma githago
Famille :	Caryophyllacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Un saponoside triterpénique, l'agrosthémine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Salivation, vomissements, coliques, diarrhée, fréquence cardiaque élevée, défaillances de la circulation, respiration rapide, tremblements, incoordination, paralysie
Biotope :	Sauvage et rare fleur des champs
Description :	Plante de 60 cm à 1 m, velue et soyeuse. Grande fleur rouge pâle solitaire de 2,5 à 4 cm. Le tube du calice porte 5 longues dents, étroites, dépassant de beaucoup les pétales. Feuilles opposées, linéaires, lancéolées à poils durs. Plante annuelle. Floraison d'avril à juin.
Degré de toxicité :	Très toxique

Nigelle des prés et Nigelle de Damas



Nom latin :	Nigella damascena
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin et plante sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

**Oenanthe safranée
ou Navet du diable (identique à la Cigûe)**



Nom latin :	Oenanthe crocata
Famille :	Ombellifères
Partie toxique :	Tubercules appelés navet du diable
Principe actif toxique :	Il s'agit d'un mélange d'alcools acétyléniques (oenanthétoxine, oenanthetol et oenanthétone)
Animaux sensibles :	Lapins Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Troubles locomoteurs et digestifs (diarrhée) d'intensité modérée ou excitation voire agressivité chez le cheval, spasmes, mâchonnement, beuglements plaintifs, convulsions violentes et mort. On observe parfois des signes de gastro-entérite (coliques, pyalisme) associés à de la dyspnée, une mydriase et un pouls faible et rapide. L'animal peut mourir en quelques minutes
Biotope :	Sauvage poussant dans les fossés et prés humides et acides ou en lisière de forêt, on la rencontre surtout dans l'ouest de la France
Degré de toxicité :	Très Toxique

Oignon et Echalote



Nom latin :	Allium Cepa
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Ataxie : mouvements perturbés par un manque de coordination des membres - Diarrhée - Hémoglobinurie - hémoglobine dans l'urine (colorant rouge du sang) - Anémie : réduction de la capacité d'oxygénation du sang, pâleur, spécialement dans les plis de la peau, les coins de la bouche et les paupières; Les cas d'empoisonnement n'apparaissent en règle générale que si les animaux sont en contact avec les bulbes ou s'ils sont nourris avec de grandes quantités

Biotope :	Jardin (et en cuisine)
Degré de toxicité :	toxique.

Oseille



Oxalis



Nom latin :	Oxalis acetosella et oxalis pes-caprae
Famille :	Oxalidacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Diarrhée, vomissements - Arythmies cardiaques - Crampes musculaires
Biotope :	Jardin et plante Sauvage
Degré de toxicité :	toxique

Pervenche de Madagascar (divers coloris)



Nom latin :	Catharanthus roseus
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Toute la plante

Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Non décrits
Degré de toxicité :	Toxique

Palmier de Madagascar ou Areca ou Palmier d'Arec



Nom latin :	Chrysalidocarpus lutescens
Famille :	Arécacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Lapins et oiseaux très sensibles
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Parisette ou raisin de renard



Nom latin :	Paris quadrifolia
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les baies
Principe actif toxique :	La parasystiphrine (paralysant respiratoire)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible

Symptômes :	Troubles digestifs, syncopes, arythmie cardiaque
Biotope :	Sauvage jusqu'à 200 mètres d'altitude
Degré de toxicité :	Toxique

Pervenche petite et grande



Nom latin :	Vinca major et Vinco minor
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Feuilles
Principe actif toxique :	Un alcaloïde, la vincamine et plusieurs flavonoïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Hypotension et vasodilatation transitoires passant souvent inaperçues
Biotope :	Jardin et à l'état Sauvage
Degré de toxicité :	Faible toxicité

Phytolaque ou raisin d'Amérique



Nom latin :	Phytolacea americana
Famille :	Phytolaccacées
Partie toxique :	Toute la plante mais particulièrement les baies même non mûres
Principe actif toxique :	Un saponoside, le phytolaccoside B et une phytohemagglutine (lectine)
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Cheval

Symptômes :	Enfllement de la gueule, troubles cardiaques et respiratoires, prostration, refroidissement, syncope. Jardin cultivé ou adventice
Biotope :	Sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

Pied d'alouette ou Delphinium



Nom latin :	Consolida regalis
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Delphinine, staphysine, ajacine et alcaloïdes terpéniques.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	On observe principalement des convulsions, une grande excitation avec mydriase, spasmes, incoordination puis paralysie générale. Le sujet peut également présenter de la diarrhée et des vomissements, une hyper salivation, des troubles cardiaques (arythmie, fibrillation ventriculaire) et dans les cas sévères une dyspnée avec bradypnée évoluant vers la mort par asphyxie
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Pieris ou Andromède



Nom latin :	Andromède polifolia
Famille :	Ericacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les feuilles
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	

Biotope :	Jardin et très rare à l'état sauvage
Description :	Fleurs : 1 à 4 fleurs roses en cloche, longuement pétiolées, pendantes, en ombelles terminales. Feuilles lancéolées, vert foncé dessus, blanc bleuâtre dessous, 1 à 3 mm de large, très enroulées. Tige dressée ou montante. Feuillage persistant. Taille de 15 à 40 cm Floraison deux fois de mai à octobre
Degré de toxicité :	Très toxique

Philodendron Monstera ou Philodendron à feuilles incisées



Nom latin :	Monstera deliciosa
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Toutes la plante
Principe actif toxique :	Acide oxalique, oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre et oiseaux très sensibles
Symptômes :	Système digestif: Diarrhée, vomissements, salivation, difficultés à déglutir, saignements Voies respiratoires Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés Organes internes: Saignements de la matrice Autre: Saignements des gencives
Degré de toxicité :	Toxique

Piment d'ornement et petit piment



Nom latin :	capsicum annuum et capsicum frutescens
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante est toxique et le jus est irritant

Principe actif toxique :	Capsaïcine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	irritations, vomissements et diarrhées.
Degré de toxicité :	Très toxique

Pin
sauf copeaux



Nom latin :	Tous les résineux
Famille :	Pinus
Partie toxique :	Toute la plante sauf les copeaux utilisés pour les litières des chats- mais ne pas utiliser de copeaux de résineux pour la litière des rats!
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin et sauvage
Degré de toxicité :	Toxique

Podophylle ou pomme de mai



Nom latin :	Podophyllum
Famille :	
Partie toxique :	Fruits verts et tige

Principe actif toxique :	Podophylène
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation excessive, vomissement, diarrhées, hyperexcitation, fièvre, coma
Degré de toxicité :	Toxique

Pois de senteur et Vesce



Nom latin :	Lathyrus
Famille :	Poacées
Partie toxique :	Cosses et graines
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Non décrits
Biotopie :	Jardin et sauvage pour la vesce (souvent adventice dans les jardins)
Degré de toxicité :	Toxique

Poinsettia ou Etoile de Noël



Nom latin :	Euphorbia pulcherrima
Famille :	Euphorbiacées
Partie toxique :	Feuilles mais surtout le suc laiteux

Principe actif toxique :	Le latex contient plusieurs principes toxiques mal connus : résine, un alcaloïde, l'euphorbine, plusieurs hétérosides et euphorbiostéroïde
Animaux sensibles :	Chiens Chats Tortue terrestre - Oiseaux très sensibles
Symptômes :	État général: Tremblements, hypothermie – refroidissement: réduction persistante de la température corporelle en dessous de 35 degrés (engourdissement, ralentissement du pouls et de la respiration) Système digestif: Vomissements Voies respiratoires / poumon: Oedème pulmonaire– accumulation de liquide dans les poumons: difficultés respiratoires (surtout couché), toux, sifflement lors de la respiration
Degré de toxicité :	Toxique

Pommes (graines)



Pomme de terre




Nom latin :	Solanum tuberosum
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Baies, germes et plantules des tubercules, pommes de terre vertes et parties aériennes ainsi que les épiluchures
Principe actif toxique :	Un glucoalcaloïde stéroïdique, la solanine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	Gastro-entérite - inflammation de l'estomac et des intestins, qui apparaît soudain et se manifeste par de forts embarras gastriques- Pouls faible, mort subite possible
Biotope :	Jardin (et en cuisine)
Degré de toxicité :	Très toxique

Pommier d'Amour



Nom latin :	Solanum pseudocapsicum
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout fruits
Principe actif toxique :	Glucos-alcaloïde = solanocapsine
Animaux sensibles :	Chats PM Tortue terrestre - Chiens très sensibles
Symptômes :	Prostration vertiges convulsions incoordination motrice paralysie des membres inférieurs anorexie coliques et diarrhées
Degré de toxicité :	Toxique

Prêle ou queue de renard ou queue de rat



Nom latin :	Equisetum arvense - Equisetum telmateia (Ehrh.) - Equisetum palustre
Famille :	Equisetacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Thiaminase, divers alcaloïdes (palustrine, équisétine) et saponosides, nicotine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Rongeurs et chevaux très sensibles
Symptômes :	Perturbations des mouvements, vertiges, hyperesthésie (sensibilité exagérée) - Tremblements musculaires, tressaillements des muscles du visage, paralysies de l'arrière-main - Effondrement - dilatation des pupilles
Biotope :	Sauvage des champs et des bas côtés
Degré de toxicité :	Toxique

Primevère



Nom latin :	Primula
Famille :	Primulacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	L'exposition au jus ou à la sève de ces plantes, ou des piqûres, peut provoquer de l'urticaire ou des irritations. Ces blessures peuvent être très douloureuses et entraîner la formation de cloques ou de brûlures relativement importantes
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxicité de contact

Pyracantha



Renoncule des prés - Renoncule bulbeuse - Renoncule rampante ou bouton d'or



Nom latin :	Ranunculus acris Ranunculus bulbosus Ranunculus repens
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante et surtout les feuilles en période de floraison
Principe actif toxique :	Plusieurs renonculosides qui libèrent après hydrolyse de la protoanémone, une huile jaune irritante aux propriétés vésicantes et drastiques
Animaux sensibles :	Chien Chats PM Chevaux Tortue terrestre oiseaux
Symptômes :	Inflammation de la muqueuse buccale avec pyalisme, coliques et constipation suivie de diarrhées noirâtres et fétides. Lors de consommation en quantité importante, on observe en outre convulsions, tremblements et mydriase, la mort pouvant survenir en une douzaine d'heures
Biotope :	Sauvage et adventice dans les jardins
Degré de toxicité :	Toxique par ingestion à très toxique

Rhubarbe



Nom latin :	Rheum raphonticum
Famille :	Polygonacées
Partie toxique :	Feuilles et racines
Principe actif toxique :	Oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Diarrhées
Biotope :	Jardin (et en cuisine)
Degré de toxicité :	Toxique

Ricin



Nom latin :	Ricinus communis
Famille :	Euphorbiacées
Partie toxique :	Toute la plante surtout les graines
Principe actif toxique :	Une lectine, la ricine, un alcaloïde, la ricinine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Diarrhées, amaigrissements convulsions hyper salivation hyperthermie. Symptômes pouvant apparaître jusqu'à 3 jours après ingestion
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique et toxicité de contact

Robinier ou faux acacia



Nom latin :	Robinia pseudoacacia
Famille :	Fabacées
Partie toxique :	Ecorce et branches
Principe actif toxique :	Glycoside = robitine et alcaloïde cyanogénique = robinine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre - Chevaux très sensibles
Symptômes :	Coliques, problèmes intestinaux, fatigue, respiration difficile, problèmes d'équilibre, dilatation des pupilles, inflammation des reins, insuffisance cardiaque
Biotope :	Jardin et sauvage
Degré de toxicité :	Très toxique

Rose du désert ou faux baobab



Nom latin :	Adenium obesum, Adenium arabicum, Nerium obesum
Famille :	Apocynacées
Partie toxique :	Toute la plante et surtout la sève
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

**Rue des chèvres
ou Sainfoin d'Espagne ou Lilas d'Espagne
ou Galega**



Nom latin :	Galega officinalis - Galega orientalis
Famille :	Légumineuses
Partie toxique :	Toute la plante même la racine
Principe actif toxique :	Divers alcaloïdes (galéagine et hydroxygaléagine) ainsi qu'un glucoside flavonique, la galutéoline
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Respiration difficile, toux, forts battements de coeur, crampes musculaires, mousse sortant du la gueules et du nez, crampes fébriles.
Biotope :	Sauvage dans les Prairies, prés humides, décharges
Degré de toxicité :	Toxique + Toxicité de contact (photosensibilisation)

Sansevieria



Nom latin :	Sanseviéria
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens PM - Chats très sensibles
Symptômes :	A faible dose ces plantes entraînent des irritations locales : bouche (hyper salivation), appareil digestif (vomissements diarrhée), peau (dermites...) etc. Les symptômes apparaissent rapidement après ingestion. L'évolution est en général favorable en 1 ou 2 jours.. En grandes quantités, risque de symptômes nerveux.
Degré de toxicité :	Toxique

Saponaire



Nom latin :	Saponaria officinalis
Famille :	Caryophyllacées
Partie toxique :	Toute la plante mais principalement les racines
Principe actif toxique :	Saponosides donnant par hydrolyse la gypsogénine (triterpène pentacyclique)
Animaux sensibles :	Chats PM - Chiens et Chevaux très sensibles
Symptômes :	L'animal présente les signes d'une gastro-entérite hémorragique, plus rarement anurie et paralysie
Biotope :	Jardin et Sauvage sur le bord des routes et chemins, dans les terrains vagues, souvent à proximité des habitations
Degré de toxicité :	Toxique

Sarrasin ou Renouée Blé noir



Nom latin :	Fagopyrum esculentum
Famille :	Polygonacées
Partie toxique :	Les jeunes fleurs, l'enveloppe des graines
Principe actif toxique :	Un pigment rouge, la fagopyrine
Animaux sensibles :	Chevaux
Symptômes :	Longue période d'incubation de quelques jours, mais apparition immédiate des symptômes lors de l'exposition au soleil: dermatite (rougeurs et œdèmes) sur des parties non protégées de la peau (lèvres, paupières, oreilles) Symptômes nerveux et Symptômes au foie
Biotope :	Jardin et Sauvage
Degré de toxicité :	Très toxique et toxicité de contact (photosensibilisante)

Sceau de salomon



Nom latin :	Polygonatum latifolium
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante particulièrement les baies
Principe actif toxique :	Anthraquinone
Animaux sensibles :	Chiens PM - Chats et Tortue terrestre très sensibles
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, arythmie cardiaque, convulsions, coma
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique

Schefflera



Nom latin :	Schefflera arboricola Brassia arboricola
Famille :	Araliacées
Partie toxique :	Toute la plante La sève est très irritante
Principe actif toxique :	Oxalates
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	.Vomissements, diarrhées, tremblements, convulsions.
Degré de toxicité :	Toxique

Scindapsus ou Pothos



Nom latin :	Epipremnum pinnatum, Scindapsus pictus
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Pousses et feuilles
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux
Symptômes :	Système digestif: Diarrhée, vomissements, salivation, difficultés à déglutir, saignements Voies respiratoires: Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés Organes internes: Saignements de la matrice Autre: Saignements des gencives
Degré de toxicité :	Toxique

Séneçon ou herbe Saint-Jacques



Nom latin :	Senecio jacobaea
Famille :	Astéracées
Partie toxique :	Toute la plante, la plus haute teneur dans les jeunes plantes et les fleurs
Principe actif toxique :	Pyrolizidine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux - Chevaux très sensibles
Symptômes :	Amaigrissement, vertiges, marche sans but (Walking Disease), agitation, bâillements fréquents, dépression, coma - Constipation ou diarrhée contenant du sang - Jaunisse - Crampes - Cécité
Biotope :	Sauvage des bas-côtés et lisières des forêts, pentes ensoleillées, prairies
Description :	Plante herbacée vivace (20-120 cm). Rhizome épais, court, non rampant et rejets

	feuillés. Tige élevée et sillonnée. Feuilles glabres, luisantes. Fleurs en capitules nombreux de 1,5 à 2,5 cm de diamètre, en corymbe ample et lâche. Ligules jaune d'or longue de 1cm Floraison de mai à août
Degré de toxicité :	Très toxique

Spathiphyllum



Nom latin :	Spathiphyllum floribundum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Feuilles Tiges
Principe actif toxique :	Cristaux d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Oiseaux - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Système digestif: Salivation, diarrhée, vomissements, saignements Voies respiratoires / poumon: Dyspnée - respiration difficile, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés Organes internes: Saignements de l'utérus Autre: Saignements des gencives, difficultés à déglutir
Degré de toxicité :	Toxique

Staphisaigre ou herbe aux poux



Nom latin :	Delphinium staphysagria
Famille :	Renonculacées
Partie toxique :	Toute la plante mais surtout les graines
Principe actif toxique :	Divers alcaloïdes, notamment delphinine, delphinoïne et staphysagroïne
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Etat d'excitation avec spasmes et convulsions, une mydriase, de l'incoordination

	évoluant en paralysie généralisée. Des signes digestifs, cardiaques et pulmonaires peuvent être observés : diarrhées, vomissements, salivation, arythmie, fibrillation ventriculaire, dyspnée / bradypnée. Le sujet meurt asphyxié
Biotope :	Ca et là, dans les endroits incultes et les champs, en régions méditerranéennes.(plante rare)
Degré de toxicité :	Toxique

Sumac de virginie



Nom latin :	Toxicodendron diversilobum
Famille :	Anacardiacees
Partie toxique :	Jus des grappes très irritant
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Sureau



Nom latin :	Sambucus pubens
Famille :	Caprifoliacées
Partie toxique :	Les baies à tous les stades
Principe actif toxique :	Glucoside cyanogénique et alcaloïdes
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Vomissement, diarrhées, coma
Biotope :	Jardin et plante sauvage
Degré de toxicité :	toxique

Syngonium



Nom latin :	Syngonium podophyllum
Famille :	Aracées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Cristaux d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Non décrits
Degré de toxicité :	Toxique

Tabac de Virginie - Tabac des paysans ou sauvage ou rustique - Tabac d'ornement



Tabac de Virginie

Tabac d'ornement

Tabac d'ornement

Tabac rustique

Fleur de tabac rustique

Nom latin :	Nicotiana rustica et Nicotiana tabacum
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Les feuilles aussi bien vertes que séchées
Principe actif toxique :	Nicotine ainsi que la nornicotine et l'anabasine

Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux
Symptômes :	Vomissements, diarrhées, détresse respiratoire, tremblements, arythmie cardiaque, coma
Biotope :	Jardin et également à l'état sauvage
Degré de toxicité :	Très toxique

Tamier
ou herbe aux femmes battues



La plante



La fleur



Le fruit

Nom latin :	Tamus communis
Famille :	Dioscoréacées
Partie toxique :	Sève
Principe actif toxique :	Plusieurs saponosides et cristaux (aiguilles) d'oxalate de calcium
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre
Symptômes :	Irritation importante de la peau et des muqueuses, coliques, vomissements, anorexie, paralysies pouvant entraîner coma et mort
Biotope :	Sauvage commune bois haies et broussailles
Description :	Liane vivace, assez banale, à souche noire et charnue semblable à un gros navet, à tige sinueuse ou en spirale très allongée (3m et plus), rameuse, munie de feuilles en cœur luisantes, à pointe effilée, à réseau de nervures très apparent. Les fleurs dont le périanthe compte 6 divisions jaunâtres sont unisexuées, mâles et femelles sur des pieds distincts. Elles s'épanouissent de mars à juillet, les unes à 6 étamines, en grappe allongée, les autres avec un pistil à 3 styles, en grappe courte comptant peu de fleurs. Le fruit est une baie ovoïde vert puis d'un rouge vif luisant
Degré de toxicité :	Très toxique

Thuja



Nom latin :	Thuja occidentalis
Famille :	Cupressacées
Partie toxique :	Toute la plante et surtout les jeunes rameaux
Principe actif toxique :	Un composé terpénique, la thuyone
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Gastro-entérite - inflammation de l'estomac et des intestins, qui apparaît soudain et se

	manifeste par de forts embarras gastriques - Crampes - Polyurie : sécrétion excessive d'urine (plus de 2,5 litres d'urine par jour) ou oligurie : sécrétion d'urine en dessous de la normale - Dommages au foie et rénaux
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Très toxique par ingestion et par contact. Des cas de brûlures ont été signalées au moment de la taille des haies.

Tomate



Nom latin :	Lycopersicon
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Les feuilles, les tiges, les tomates vertes
Principe actif toxique :	Solanine, demissine, lycophène.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Tortue terrestre oiseaux
Symptômes :	Mydriase, vomissements, diarrhées, détresse respiratoire, abattement.
Biotope :	Jardin
Degré de toxicité :	Toxique

Troène



Nom latin :	Ligustrum vulgare
Famille :	Oléacées
Partie toxique :	Feuilles et fruits
Principe actif toxique :	Ligustrine, syringine et alcaloïdes

Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles
Symptômes :	Incoordination, hyperthermie - température corporelle extrêmement élevée - Coliques - Paralysies - Dilatation des pupilles - Tachycardie (pulsations cardiaques au-dessus de 100 par minute) mort éventuelle dans les 4 à 48 heures
Biotope :	Jardin et Plante sauvage des Forêts, lisières des forêts, haies
Degré de toxicité :	Toxique

Tulipe



Nom latin :	<i>Tulipa gesneriana</i>
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	Tulipaline.
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Salivation, vomissements, coliques
Degré de toxicité :	Toxique

Tussilage ou pas d'âne



Nom latin :	Tussilago farfaro
Famille :	Astéracées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux
Symptômes :	Des dommages au foie sont à prévoir uniquement en cas d'ingestion de grandes quantités
Biotope :	Plante sauvage. Sols humides, champs, carrières, bas-côtés
Degré de toxicité :	Très peu toxique

Vérâtre blanc Hellébore blanc ou Varaire



Nom latin :	Veratrum album
Famille :	Liliacées
Partie toxique :	Toute la plante même sèche
Principe actif toxique :	Nombreux alcaloïdes dépresseurs cardio-respiratoires et hypotenseurs : rubijervine, isorubijervine, germine, protovérine
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Hypothermie : refroidissement: baisse persistante de la température corporelle en dessous de 35 degrés - Salivation, coliques, diarrhée - : Respiration lente - Crampes, paralysies - Hypotonie - pression basse; bradycardie - pulsations en dessous de 60 par minute
Biotope :	Plante sauvage. Régions alpines, prairies humides, clairières
Description :	Plante d'un port élégant pourvue d'un rhizome vertical se prolongeant en une tige haute de 60 cm à 1 m, enveloppée à sa partie inférieure d'un grand nombre de grandes feuilles larges, molles, plissées et légèrement velues. Feuilles de la tige plus petites, plus espacées, alternées et velues en dessous. Sur le haut de la tige, grappe rameuse, longue et droite de fleurs blanchâtres en dedans, verdâtres en dehors. Fleurit en juillet - août.
Degré de toxicité :	Très toxique

Violette bleue



Nom latin :	Browallia
Famille :	Solanacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Non décrits
Degré de toxicité :	Toxique

**Viorne obier
ou Rose de Gueldre ou Boule de neige**



Nom latin :	Viburnum opulus
Famille :	Caprifoliacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Essentiellement les chiens et les tortues terrestres
Symptômes :	Non décrits
Biotope :	Jardin et plante sauvage des clairières humides
Degré de toxicité :	Toxique

Vipérine ou herbe aux vipères



Nom latin :	Echium vulgare
Famille :	Boraginacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre
Symptômes :	Irritation de la paroi de l'estomac - Lors d'ingestion en grandes quantités : dommages au foie
Biotope :	Plante sauvage des Versants secs, décharges, bas-côtés, carrières
Degré de toxicité :	Toxique

Yucca



Nom latin :	Yucaa Spp
Famille :	Agavacées
Partie toxique :	Toute la plante
Principe actif toxique :	
Animaux sensibles :	Chiens Chats PM
Symptômes :	Ptyalisme et coliques avec hypothermie ; dans les cas graves, paralysie du train postérieur et coma
Degré de toxicité :	Toxique